

Papillomavirus

Un dispositif de vaccination pour protéger les 11 - 26 ans

Depuis le **12 décembre 2025**, le vaccin **Gardasil 9**, destiné à prévenir les infections à papillomavirus humains (HPV), est désormais remboursé pour **toutes les jeunes filles et tous les jeunes garçons de 11 à 26 ans** (au lieu de 19 ans auparavant). Son prix de **115,84 €** est couvert à **65 %** par la Sécurité sociale et à **35 %** par les complémentaires santé.

Le **cancer du col de l'utérus** est une tumeur maligne développée à partir des cellules superficielles du col utérin et est principalement causé par une infection prolongée au HPV. Avec **2 900 nouveaux cas en 2018**, en France, il représente le **12^{ème} cancer féminin le plus fréquent** et se développe généralement **10 à 15 ans** après l'infection initiale.

PRINCIPAL FACTEUR DE RISQUE : LE PAPILLOMAVIRUS

L'infection par un virus HPV est l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente dans le monde (80 % des femmes sont infectées au moins une fois dans leur vie).

Elle guérit le plus souvent spontanément. Mais dans 10 % des cas (notamment sous l'influence d'autres facteurs comme la précocité des rapports sexuels ou le tabagisme), le virus persiste au niveau de la muqueuse du col utérin et peut alors provoquer des modifications de l'épithélium, appelées lésions précancéreuses, susceptibles d'évoluer vers un cancer.

Il existe plusieurs facteurs qui augmentent le risque de développer un jour un cancer du col de l'utérus :

- La précocité des rapports sexuels
- La multiplicité des partenaires sexuels
- Le tabagisme
- Être porteur du virus VIH ou être sous traitement immunosuppresseur
- Le fait d'avoir eu plusieurs enfants (multiparité)
- L'utilisation prolongée de contraceptifs hormonaux
- Certaines infections sexuellement transmissibles (chlamydie ou herpès génital)



PRÉVENIR l'infection à papillomavirus humain à tout âge

La vaccination contre les papillomavirus humains est capitale pour prévenir le cancer du col de l'utérus.

Cependant, le vaccin ne protège pas contre toutes les infections à papillomavirus.

C'est pourquoi il est nécessaire, **chez les femmes de 25 à 65 ans, même si elles sont vaccinées, de réaliser des frottis de dépistage selon des modalités** qui dépendent de l'âge.

LE VACCIN CONTRE LE PAPILLOMAVIRUS HUMAIN DANS LE PORTEFEUILLE VERLINGUE

L'âge moyen des bénéficiaires de notre portefeuille ayant reçu au moins une dose de vaccin est de 14,4 ans et l'âge médian est de **14 ans**. Chaque bénéficiaire a reçu en moyenne 1,6 dose.



1 enfant sur 2

a reçu au moins une dose de vaccin*



TAUX DE VACCINATION PAR SEXE




55 % DES FILLES



45 % DES GARÇONS

* Parmi nos bénéficiaires âgés de 11 à 14 ans

ÂGE AUQUEL LES BÉNÉFICIAIRES SONT VACCINÉS



On constate que la couverture vaccinale augmente ces dernières années, **depuis l'instauration de la campagne de vaccination au collège** (septembre 2023).

La vaccination gratuite proposée en milieu scolaire a également un impact positif sur les injections réalisées par les professionnels de ville (médecins, sage-femmes, pharmaciens, infirmiers, ainsi que dans les services de vaccination municipaux ou départementaux) pour l'ensemble des adolescents de 11 à 14 ans ciblés par les recommandations de vaccination contre les HPV.

Ces augmentations soulignent l'importance de reconduire ces campagnes en milieu scolaire et de renforcer la communication autour de celles-ci, afin d'atteindre **l'objectif de 80 % à l'horizon 2030** (objectif national fixé dans le cadre de la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030).